

張開。然後他把一個彎形的刀（刮匙）伸入子宮內，把胎盤及嬰兒切成碎片，刮出體外。通常會流大量的血。

什麼是子宮頸擴張及吮吸手術？

這與刮宮手術差不多，但用的是一條空心的膠管，在尖端有刀狀的邊緣，插入子宮後，把嬰孩撕成碎片，再把植根已深的胎盤從內壁切去。這些碎片被吸吮出來放入瓶內。

吮吸術是最安全的，可不是嗎？

很多贊成墮胎的狂熱者會這樣說，但所有的外科醫生都不同意。這方法使用後的首數天，常常有大量出血，這就需要進行第二次的刮宮手術，通常是需要輸血的。以美國紐約為例，在墮胎手術開始大量進行後，西部的醫院就常有此種情形發生，甚至在同一架飛機紐約的飛機裏就有四個女子因大量出血而要離機。

刮宮手術最遲要幾時施行？


多數醫生不會在第十二週後施行刮宮手術。

甚麼是子宮切開術？


這是類似開腹產術，母親的腹部及子宮均施以手術切開，嬰兒連同胎盤被切除。這方法通常是使用於妊娠的後期。一名美國的醫生在替人施行這種手術後，取出了一個小嬰孩——他仍在呼吸，試圖叫喊，並舞手弄足——於是他把胎盤壓在嬰孩身上，使他窒息。

你是說有些這樣取出的嬰孩是活著的嗎？

差不多所有從子宮切開手術取出的嬰兒都是活生生的。他們需要被殺死或使他由於缺乏照顧而致死。



這是加拿大一所醫院一個上午進行墮胎手術的結果，一大簇十八至廿四週的胎兒被無辜殺害。



未誕生的嬰兒擁有成人的一切品質和特徵，只有年齡及成熟程度上的差異。